

en entier et 10 entièrement, noir-cuivré; 8-9 bleus, avec une tache noire de chaque côté au milieu; bord postérieur du 10e fendu au milieu; appendices supérieurs larges, creusés en dedans avec un tubercule pâle en dessous; les inférieurs pâles, à peine plus longs, aigus. Ailes hyalines; stigma rhomboïdal, noir; 14 post-orbitales.

♀ A la tête et sur le dos du thorax le jaune roussâtre remplace le bleu. Abdomen à bande dorsale noir-cuivré plus étroite et dilatée avant le sommet; stigma jaune.

Assez rare; remarquable par sa forte taille.

A continuer.

ADDITIONS AUX ICHNEUMONIDES DE QUÉBEC.

(Continué de la page 318).

Gen. **TRYPHON**. Grav. (Nat. Vol. VII, p. 351).

Tryphon Clapini. (Tryphon de Clapin) *nov. sp.*

♀. Long. .55 pouce. Noir; la face, excepté un point de chaque côté au dessus du chaperon, le scape en dessous, les mandibules, les palpes, les 4 jambes antérieures avec un anneau aux postérieures, jaune-pâle. Antennes noires. Thorax ponctué; métathorax rugueux, écusson grand, blanc. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma, noir; aréole sub-quadrangulaire, l'angle extérieur avec un commencement de nervure se dirigeant vers l'extrémité de l'aile. Pattes noires, les 4 cuisses antérieures avec les genoux et le dedans, blanc. Abdomen roux foncé, subpédiclé, le premier segment noir, roux seulement à l'extrémité, canaliculé au milieu avec les stigmates saillants en tubercules vers le milieu.

Un seul spécimen, capturé à St. Hyacinthe par le Rév. G. Clapin, auquel nous le dédions. C'est la plus forte taille du genre que nous ayons encore rencontrée.

Gen **Paniscus**. Grav. Vol. VI, p. 107.

9. **Paniscus rufulus**. (Panisque rougeâtre), *nov. sp.*

♀ Long. .30 ponce. D'un beau jaune roux, luisant, uniforme dans toutes ses parties ; les orbites antérieurs, les mandibules excepté à l'extrémité, les palpes, les écailles alaires, d'un jaune très pâle. Antennes longues, sétacées. Ecusson un peu élevé, poli, brillant, de même couleur que le reste. Métathorax arrondi, à lignes peu soulevées, mais bien distinctes. Ailes hyalines, à nervures brunes ; stigma très grand, brun, taché de blanc à la base ; aréole grande, en losange, subpédicellée. Pattes longues, assez grêles. Abdomen poli, luisant, à côtés presque parallèles, le premier segment s'élargissant de la base au sommet, comprimé dans sa dernière moitié seulement ; tarière assez forte, courte, moins du quart de l'abdomen, ses valves rousses.

Un seul spécimen ♀. La forme de l'aréole de cette espèce semble déroger à la loi commune ; cette aréole qui a la forme d'un carré, présente ses angles aux bords antérieurs et postérieurs de l'aile, ce qui lui donne l'apparence d'un losange.

Gen. **ATRACTODES**, Grav. Vol. VII, p. 333.

6. **Atractodes singularis**. (Atractode singulier), *nov. sp.*

Long. .30 ponce. Noir ; abdomen roux ; palpes blanches. Antennes de longueur moyenne, assez fortes, sétacées. Thorax fortement ponctué ; écailles alaires noires, luisantes. Métathorax large, fortement ponctué, à lignes soulevées peu apparentes, sub-épineux au bas postérieurement. Ailes hyalines, nervures et stigma, noir ; aréole en carré, subpentagonale, assez grande. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec les tarses, blanchâtres. Abdomen longuement pédiculé, le reste fusiforme, le 1er segment à peine élargi en arrière, stigmates saillants au delà du milieu, 2e segment en entonnoir, de moitié plus large au sommet qu'à la base ; le reste allant en diminuant et comprimé à l'extrémité.

Un seul spécimen ♂. La forme singulière du 2e segment abdominal, qui est nettement pyriforme, lui donne une apparence tout à fait singulière.